BETASONE®

Bétaméthasone

COMPOSITION

Bétaméthasone……..…..500 mg
Excipients…….q.s.p.100 ml
Excipients à effet notoire : propylène glycol, saccharose et sorbitol.
1 ml= 40 gouttes= 0,5 mg de bétaméthasone.

INDICATIONS

Ce sont celles de la corticothérapie chez l'enfant.
BETASONE Gouttes peut être également utilisé chez l'adulte, notamment lorsqu'il s'agit de baisser progressivement les doses de la corticothérapie.
Le médecin traitant est seul juge de la prescription et des modalités d'administration.

CONTRE-INDICATIONS

Ce sont celles de la corticothérapie, notamment l'herpès fébrile de la cornée, l'ulcère gastrique ou duodénal en évolution, le diabète et l'hypertension artérielle.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS

BETASONE Gouttes n'est pas destiné à l'usage ophtalmologique.
Sportifs : Attention! Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.
En raison de la présence du sorbitol et du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.
Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des symptômes semblables à ceux provoqués par l'alcool.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La posologie journalière et la durée de traitement varient selon les indications et le poids du patient.
Se conformer à la prescription médicale.
Verser les gouttes de BETASONE dans un peu d'eau. L'ingestion de la solution se fait de préférence après les repas.

BETASONE®

Betamethasone

COMPOSITION

Betamethasone…….. 500 mg
Excipients…….…….....…..s.q.f. 100 ml
Excipients with known effect: propylene glycol, saccharose and sorbitol.
1 ml= 40 drops= 0.5 mg of betamethasone

INDICATIONS

The indications of BETASONE Drops are those of corticosteroid therapy in children.
BETASONE Drops can be administrated in adults, notably when the aim is to decrease progressively doses of the corticosteroid therapy.
The treating doctor should be the sole judge of the prescription and modes of administration.

CONTRA-INDICATIONS

The contra-indications of BETASONE Drops are those of corticosteroid treatment, namely herpes with fever and cornea damages; evolutive peptic ulcer; diabetes and high blood pressure.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

BETASONE Drops is not intended for ophthalmological use.
Sportmen / Sporwomen : Beware! This medicine contains an active principle that can induce a positive reaction in anti-doping tests.
Due to the presence of sorbitol and saccharose, this drug is contra-indicated in case of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase insufficiency.
This drug contains propylene glycol, so it can cause symptoms like those provoked by alcohol.

MODE OF USE AND POSOLOGY

The daily posology and the period of treatment vary according to the indications and the patient's weight.
Refer to the medical advice.
Pour the drops of BETASONE in a little water. Drink this solution preferably after meals.

FORME ET PRESENTATION
Gouttes buvables, Flacon de 30 ml avec une pipette compte-gouttes graduée.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 25°C.
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.
Après ouverture, ce médicament peut être conservé pendant 8 semaines maximum.

Liste I

AMM : n° E-2008-064

FORM AND PRESENTATION
Oral drops, 30 ml bottle with a measuring dropper pipette.
STORING CONDITIONS
Below 25°C.
Store the bottle in its original packaging, away from light.
After the first opening, this medicine can be kept for up to a maximum of 8 weeks.

List I

AMM : n° E-2008-064

La date de péremption indiquée se réfère au produit correctement conservé dans le conditionnement intact
The indicated expiration date concerns the product correctly conserved in the intact bottle

Laboratoires OLEA
25 B.P 276 ABIDJAN 25 - Côte d'Ivoire
olea@umaline.com